

# 國立彰化師範大學 97 學年度碩士班招生考試試題

系所：運動健康研究所碩士班

科目：體育統計學

☆☆請在答案紙上作答☆☆

共 2 頁，第 1 頁

## 一、選擇題 (每小題 4%，共 80%)

1. 若已知田徑隊男生與女生的體重群體資料為一常態分布，欲檢定男生與女生體重之變異程度是否顯著不同，宜用何種統計方法檢定？(A)  $\chi^2$  test (B) paired t test (C) F test (D) Z test。
2. 比較低氧訓練前後血糖測量值是否顯著降低，應使用何種檢定方法 (A)ANOVA (B)McNemar's  $\chi^2$  檢定 (C)Z 檢定 (D)配對 t 檢定。
3. 調查鄉村 20-50 歲婦女每日運動時數，根據年齡層各抽 30 名作研究為 (A)簡單隨機 (B)集束 (C)分層 (D)系統。
4. 抽樣分布是指下列何者之機率分布 (A)母體統計量 (B)樣本統計量 (C)樣本參數 (D)母體參數。
5. 統計假設檢定時，如果樣本數固定為 100，而  $\alpha$  值由 0.05 降為 0.01，此改變會使  $\beta$  error (A) 增加 (B) 減少 (C) 不變 (D) 無法決定。
6. 檢定母群體平均值時，若母群體為常態分布且為小樣本研究，下列何者正確 (A)母群體為變異數已知時用 Z 檢定 (B)小樣本研究用 t 檢定 (C)母群體偏離常態分布用 t 檢定 (D)以上皆是。
7. 45 名大一學生在學期初與學期末被詢問喜不喜歡上體育課，如欲檢定學期前後學生喜歡體育課情形有無顯著改變，應用何種檢定 (A)Pooled t test (B)Paired t test (C)  $\chi^2$  test (D) McNemar's  $\chi^2$  test。
8. 在 ANOVA 分析表中，下列何者不具加法性 (A)the sum of squares (B)the degrees of freedom (C)the mean squares (D)以上皆非。
9. 統計中，用直線方程式作預測時，是用何種方法估計參數 (A)最大概似法 (B)最小變異數法 (C)最小平方法 (D)最小卡方法。
10. 根據某一類別變數，以估計另一變數可能產生平均值的變動，並測量這種估計可能產生誤差的過程為 (A)迴歸分析 (B)相關分析 (C)適合度檢定 (D)變異數分析。
11. 某研究發現訓練時數與運動成績之相關係數  $r=0.8$ ，已知訓練時數之標準差為 5，運動成績之標準差為 6，則以訓練時數預測運動成績之迴歸係數應為 (A)0.8 (B)0.64 (C) 0.67 (D) 0.96。
12. 若使用變異數分析時，違反變異數同質性之假設，可用下列何種方法進行補救最為適宜？ (A) 增加樣本人數 (B)以效應量取代 F 檢定值 (C)訂定較嚴格之顯著水準 (D)進行資料轉換。
13. 在二因子混合設計變異數分析中，若相依樣本自變項 A 有 2 個處理水準，獨立樣本自變項 B 有 3 個處理水準，則在等組條件下，若每一實驗處理樣本數為 6 名，則應抽取幾名樣本？ (A) 6 (B) 12 (C) 18 (D) 30。
14. 在推論統計時，卡方百分比同質性考驗之自由度是由下列何者決定？ (A)理論期望次數 (B) 樣本人數 (C)樣本數與母群數之比 (D)變項類別數。
15. 下列哪一圖形能用來檢定變項之相關程度？ (A)常態機率散佈圖 (B)交叉散佈圖 (C)平均數趨勢圖 (D)長條圖。

# 國立彰化師範大學 97 學年度碩士班招生考試試題

系所：運動健康研究所碩士班

科目：體育統計學

☆☆請在答案紙上作答☆☆

共 2 頁，第 2 頁

16. 下列有關研究假設敘述何者有誤？(A)統計假設是將研究假設以數學或統計符號加以表示  
(B)研究假設是一種科學假設 (C)研究者感到興趣或支持的是對立假設 (D)為方便假設考驗，對立假設通常以否定句表示。
17. 下列關於平均數假設考驗的統計考驗力陳述何者為錯？(A)樣本數目愈多，統計考驗力就愈大 (B)雙側考驗的統計考驗力高於單側考驗的統計考驗力 (C)顯著水準愈大，統計考驗力就愈高 (D)統計考驗力只有在研究假設為真時才能計算。
18. 若已知一母群的平均數為 50，變異數為 100，若從此母群中抽取樣本 20 人的樣本許多個，請問樣本平均數次數分配的變異數為多少？(A) 2 (B) 5 (C) 10 (D) 100。
19.  $\alpha$  級數的主要誤差來源為 (A)時間抽樣與內容抽樣 (B)時間抽樣與內容異質 (C)內容抽樣與內容異質 (D)樣本抽樣與內容異質。
20. 為了解教練領導能力 (X) 與選手學科學習能力 (Y) 之關係，隨機抽樣 100 位選手進行此項檢測，二者之皮爾遜積差相關係數值為 0.19。請問在顯著水準為 0.05 時，下列敘述何者正確？(A)X 與 Y 為正相關 (B) X 與 Y 為負相關 (C) X 與 Y 為零相關 (D)X 與 Y 為自相關。

## 二、解釋名詞 (每小題 4 %，共 20%)

- (1) percentile rank 與 percentile point
- (2) standard deviation 與 standard error
- (3) within-subjects factor 與 between-subjects factor
- (4) multiple stepwise regression analysis
- (5) t-test, correlated samples